

レジメン番号	682	レジメン名	JALSG Ph+ALL 213 mainte.
登録診療科	血液内科	使用薬剤	オンコビン、プレドニゾロン、スプリセル
がん腫	フィладельフィア陽性急性リンパ性白血病	インターバル日数	35日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 ( / )	Day2-7 ( / - / )	...	Day28 ( / )	...Day35	Day1 ( / )
オンコビン (VCR) 1.3mg/m <sup>2</sup> (Max:2mg/body)	静注	mg	↓				5週間を 1コース	↓
プレドニゾロン(PSL) 60mg/m <sup>2</sup>	内服	mg	↓	↓	適宜 漸減			↓
スプリセル (DA) 100mg/day	内服	mg	↓	↓	↓	↓		↓

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①オンコビン	1mg	生食 50ml	5分/点滴
②生食	50ml		メインルート
③生食	50ml		5分/点滴

【当日の投与方法】

(Day1)

投与間隔≫ (メイン) (5分) (5分)  
 投与順番≫ ② → ① → ③ → 終了

【備考】

- ・プレドニゾロン：60mg/m<sup>2</sup> day1-7 内服しその後徐々に漸減する
- ・スプリセル：1日1回 100mg/body 内服 day1-28 内服