


レジメン番号	0712	レジメン名	FOLFOXIRI+Cmab(biweekly)
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	レボホリナート、フルオロウラシル、エルプラット、トポテシン、アービタックス
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	・・・Day14	Day1 ( / )
トポテシン(CPT-11) 130mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
レボホリナート(L-LV) 200mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓		↓
エルプラット(I-OHP) 85mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 2400mg/m <sup>2</sup> /日	持続注入	mg	↓		↓
アービタックス (Cmab) 500 mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓		↓
(支持療法)					
A) パロノセトロン(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	5%ブドウ糖 500mL	60分/点滴
	100mg		
②レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖 250mL	120分/点滴
	100mg		
③エルプラット	100mg	5%ブドウ糖 250mL	120分/点滴
④フルオロウラシル	250mg	生食適量	48hr 持続注入
	1000mg		
⑤アービタックス	100mg	生食 225mL	120分/点滴
⑥	パロノセトロン	生食 100mL	15分/点滴
	グラニセトロン		
	デキサート		
	ネオレスタール		
⑦生食	100mL	生食 100mL	30分/点滴
⑧生食	100mL	生食 100mL	下記参照/点滴



【備考】

※1 アービタックス投与終了後からエルプラット投与開始までの時間(生食⑦の投与時間)

初回 60分/2回目以降 15分