


レジメン番号	0719	レジメン名	FOLFOX+Cmab(biweekly)
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	レボホリナート、フルオロウラシル、エルプラット、アービタックス
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day14	Day1 (/)
レボホリナート(1-LV) 200mg/ m ² /日	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
フルオロウラシル (5-FU) 400mg/ m ² /日	点滴	mg	↓		↓
エルプラット(1-OHP) 85mg/ m ² /日	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5-FU) 2400mg/ m ² /日	持続注入	mg	↓		↓
アービタックス(Cmab) 500mg/ m ² /日	点滴	mg	↓		↓
(支持療法)					
A) パロノセトロン(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖 250mL	120分/点滴
	100mg		
② フルオロウラシル	250mg	5%ブドウ糖 100mL	5分/点滴
	1000mg		
②' フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
	1000mg		
③エルプラット	100mg	5%ブドウ糖 250mL	120分/点滴
④アービタックス	100mg	生食 225mL	120分/点滴
⑤	パロノセトロン	生食 100mL	15分/点滴
	または グラニセトロン		
	デキサート		
	ネオレスタール		
⑥ 生食	100mL	生食 100mL	30分/点滴
⑦ 生食	100mL	生食 100mL	点滴 ※1



【備考】

※1 アービタックス投与終了後からエルプラット投与開始までの時間(生食⑦の投与時間)

初回 60分/2回目以降 15分