

| | | | |
|--------|---------|----------|-------------------|
| レジメン番号 | 0722 | レジメン名 | Nivo+XELOX |
| 登録診療科 | 総合消化器外科 | 使用薬剤 | オプジーボ、ゼローダ、エルプラット |
| がん腫 | 胃癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day 2~14 | …Day21 | Day1 (/) |
|--|------|-------|---------------|-------------|----------|---------------|
| エルプラット(1-OHP) 130mg/m ² /日 | 点滴 | mg | ↓ | | 3週間を1コース | ↓ |
| ゼローダ 2000mg/m ² /日※ | 内服 | mg | ↓ | ↓ | | ↓ |
| オプジーボ(Nivo) 360mg/body/日 | 点滴 | mg | ↓ | | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|-----------|---|--|----------|---|
| A) パロセトロン(0.75) B) グラニセトロン(1) | 点滴 | ○ を mg | ↑ | | 3週間を1コース | ↑ |
| デキサート 6.6mg/body | 点滴 | 6.6mg | ↑ | | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-----|--------------------------|-----------------|--------------|---------|
| ① | エルプラット | 100mg | 5%ブドウ糖 500mL | 120分/点滴 |
| | デキサート | 1.65mg | | |
| ② | パロセトロン または グラニセトロン | 0.75mg 1mg | 5%ブドウ糖 100mL | 15分/点滴 |
| | デキサート | 3.3mg 1.65mg | | |
| | | 生食 | | |
| ③ | 生食 | 100mL | | 15分/点滴 |
| ④ | 生食 | 100mL | | 15分/点滴 |
| ⑤ | オプジーボ | 240mg 120mg | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| | | 生食 | | |

投与間隔≫

(15分) (30分) (5分) (15分) (120分) (15分)

投与順番≫

④ → ⑤ → ⑥ → ② → ① → ③ → 終了

【備考】

※ゼローダ：1日2回 2週間内服、1週間休薬