

レジメン番号	0724	レジメン名	Nivo+FOLFOX
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	オプジーボ、フルオロウラシル、レボホリナート、エルプラット
がん腫	胃癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	...	Day15 (/)	...	Day1 (/)
オプジーボ (Nivo) 240mg/body	点滴	mg	↓		↓	隔週投与を繰り返す	↓
レボホリナート(L-LV) 200mg/ m ² /日	点滴	mg	↓		↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 400mg/ m ² /日	点滴	mg	↓		↓		↓
エルプラット(L-OHP) 85mg/ m ² /日	点滴	mg	↓		↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 2400mg/ m ² /日	持続注入	mg	↓		↓		↓

(支持療法)

A)パロノセトロン(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑		↑		↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ニボルマブ	240mg	生食	30分/点滴
② レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
③ bolus フルオロウラシル	250mg	5%ブドウ糖液 100mL	全開/点滴
	1000mg		
④ フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
	1000mg		
⑤ エルプラット	100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
⑥ パロノセトロン または グラニセトロン デキサート	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
⑦ 生食	100mL		15分/点滴
⑧ 生食	50mL		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分) (30分) ⑤ (120分) (5分) 46時間 (持続注入)

投与順番≫ ⑦ → ① → ⑧ → ⑥ → ② → ③ → ④ → 終了

【備考】
