

レジメン番号	0704	レジメン名	DVMP 初回サイクル(ダラキューロ)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラキューロ、ベルケイド レナデックス、プレドニゾロン、アルケラン
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	42日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day8 (/)	Day11 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	Day25 (/)	Day29 (/)	Day32 (/)	Day36 (/)	6週間を 1コース	Day1 (/)
ダラキューロ配合皮下注 1V/body	皮下注	V	↓				↓		↓	↓		↓		↓		↓
ベルケイド 1.3mg/m ²	皮下注	mg	↓			↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓			↓
レナデックス 20mg/body	経口	mg	↓				↓		↓	↓		↓		↓		↓
プレドニゾロン 60mg/m ²	経口	mg		↓	↓	↓										↓
アルケラン 9mg/m ²	経口	mg	↓	↓	↓	↓										↓

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラキューロ 配合皮下注			皮下注(※)
② ベルケイド	3mg	生食 1.2mL	皮下注

(Day1,8,22,29)

投与間隔≫ (皮下注) (皮下注)

投与順番≫ ①開始 1～3 時間前に
アセトアミノフェン 500mg 2T
d-クロルフェニラミン 6mg 1T ① → ② → 終了
レナデックス 4mg 5T
を内服

(Day15,36)

投与間隔≫ (皮下注)

投与順番≫ ①開始 1～3 時間前に
アセトアミノフェン 500mg 2T
d-クロルフェニラミン 6mg 1T ① → 終了
レナデックス 4mg 5T
を内服

(Day4,11,25,32)

投与間隔≫ (皮下注)

投与順番≫ ② → 終了

【備考】

①※臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に、本剤 15mL を約 3～5 分かけて投与する。