

レジメン番号	732	レジメン名	IsaKd 療法 2 サイクル以降
登録診療科	血液内科	使用薬剤	カイプロリス、サークリサ
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day8 (/)	Day9 (/)	Day15 (/)	Day16 (/)	Day22 (/)	Day23 (/)	…Day28	Day1 (/)
カイプロリス 56mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓			4 週間を 1 コース	↓
サークリサ 10mg/kg	点滴	mg	↓			↓						↓
デキサート 20mg/body	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓				↓
レナデックス 20mg/body	内服	mg							↓	↓		

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① カイプロリス	10mg	5%ブドウ糖 100mL	30 分/点滴
	40mg		
② サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	※/輸注ポンプ
	500mg		
③ デキサート	3.3mg	5%ブドウ糖 100ml	15 分/点滴
④ 生食	50mL		5 分/点滴

【当日の投与方法】

《Day1,15》

投与間隔》

(メインルート/持続)

(15 分)

(30 分)

(※)

(5 分)

サークリサ開始 15～60 分間前に服用

投与順番》
 ・アセトアミノフェン 500mg 2T
 ・d-クロルフェニラミン酸塩徐放錠 6mg 1T
 ・ファモチジン OD20mg 1T
 ⑤ → ③ → ① → ② → ④ → 終了

《Day2,8,9,16》

投与間隔》

(メインルート/持続)

(15 分)

(30 分)

(5 分)

投与順番》 ⑥ → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

⑤5%ブドウ糖 250mL(メインルート) (Day1,15)

⑥5%ブドウ糖 100mL(メインルート) (Day2,8,9,16)

③デキサメタゾンが必要に応じて内服へ変更可。

※サークリサ投与速度：非常に複雑のため、メーカー作成の換算表を参照