

レジメン番号	733	レジメン名	Isatuximab 単剤療法 初回サイクル
登録診療科	血液内科	使用薬剤	サークリサ
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	Day15 ( / )	Day22 ( / )	…Day28
サークリサ 20mg/kg	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	4 週間を 1 コース

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	※/輸注ポンプ
	500mg		
② ソル・メドロール	40mg	生食 100ml	15 分/点滴
③ 生食	50mL		5 分/点滴

【当日の投与方法】

投与間隔≫

(メインルート/持続)

(15 分)

(※)

(5 分)

投与順番≫ 開始 15～60 分間前に服用  
 ・アセトアミノフェン 500mg 2T  
 ・d-クロルフェニラミン酸塩徐放錠 6mg 1T ④ → ② → ① → ③ → 終了  
 ・ファモチジン OD20mg 1T

【備考】

④生食 250mL(メインルート)

※サークリサ投与速度：非常に複雑のため、メーカー作成の換算表を参照