

レジメン番号	738	レジメン名	DPd療法 7サイクル以降
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラキューロ、ポマリスト
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	...	Day8 (/)	Day9 (/)	...	Day15 (/)	Day16 (/)	...	Day21 (/)	Day22 (/)	Day23 (/)	...Day28	Day1 (/)
ダラキューロ 配合皮下注 1V/body	皮下注	1V	↓												4週間を 1コース	↓
ポマリスト 4mg/日	経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				↓
レナデックス 20mg/body	経口	mg	↓	↓		↓ 40mg/回			↓ 40mg/回				↓ 40mg/回			↓

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラキューロ 配合皮下注			皮下注(※)

【当日の投与方法】

投与間隔≫

(皮下注)

ダラキューロ開始 1~3 時間前に服用

投与順番≫

- ・アセトアミノフェン 500mg 2T
- ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg 1T
- ・レナデックス 4mg 5T

① → 終了

【備考】

①※臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に、本剤 15mL を約 3~5 分かけて投与する。

・75 歳を超える場合は、デキサメタゾンを 20mg/週で投与可。

・デキサメタゾン day8,15,22 は 40mg/回で内服。