

レジメン番号	739	レジメン名	(C-2) FOLFIRI (小腸癌)
登録診療科	消化器内科	使用薬剤	トポテシン、レボホリナート フルオロウラシル
がん腫	小腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
トポテシン(CPT-11) 150mg/m ²	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
レボホリナート(L-LV) 200mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 400mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 2400mg/m ² /日	持続注入	mg	↓		↓

(支持療法)

A)パロセトロン(0.75) B)グラセトロン(1)	点滴	○を mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	5%ブドウ糖 250mL	90分/点滴
	100mg		
②レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖 250mL	120分/点滴
	100mg		
③フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	5分/点滴
	1000mg		
④フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
	1000mg		
⑤	パロセトロン	生食 100mL	30分/点滴
	または グラセトロン		
	デキサート		

【当日の投与方法】



【備考】
