

レジメン番号	0740	レジメン名	DCyBorD 療法 1・2 サイクル
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラキューロ、ベルケイド、エンドキサン、 レナデックス
がん腫	AL アミロイドーシス	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day8 (/)	Day9 (/)	Day15 (/)	Day16 (/)	Day22 (/)	Day23 (/)	…Day28
ダラキューロ 配合皮下注 1V/body	皮下注	1V	↓		↓		↓		↓		4 週間を 1 コース
ベルケイド 1.3mg/m ²	皮下注	mg	↓		↓		↓		↓		
エンドキサン 300mg/m ²	経口	mg	↓		↓		↓		↓		
レナデックス 20mg/body	経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラキューロ 配合皮下注			皮下注(※)
② ベルケイド	3mg	生食 1.2mL	皮下注

【当日の投与方法】

投与間隔≫		(皮下注)	(皮下注)	
投与順番≫	ダラキューロ開始 1～3 時間前に服用 ・アセトアミノフェン 500mg ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg ・レナデックス 4mg	2T 1T 5T	① → ② →	終了

【備考】

- ①※臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に、本剤 15mL を約 3～5 分かけて投与する。
- ・ 70 歳を超える、過少体重（BMI：18.5kg/m²未満）、糖尿病の場合は、デキサメタゾンを 20mg/週で投与可。
- ・ エンドキサンの最大週間投与量は、体表面積にかかわらず 500mg/body。
- ・ エンドキサンは点滴投与へ変更可（生食 250mL に溶解し、1 時間で投与）。