

レジメン番号	0741	レジメン名	DCyBorD療法 3-6サイクル
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラキューロ、ベルケイド、エンドキサン、レナデックス
がん腫	AL アミロイドーシス	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day8 (/)	Day9 (/)	Day15 (/)	Day16 (/)	Day22 (/)	Day23 (/)	…Day28
ダラキューロ 配合皮下注 1V/body	皮下注	1V	↓				↓				4週間を 1コース
ベルケイド 1.3mg/m ²	皮下注	mg	↓		↓		↓		↓		
エンドキサン 300mg/m ²	経口	mg	↓		↓		↓		↓		
レナデックス 20mg/body	経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラキューロ 配合皮下注			皮下注(※)
② ベルケイド	3mg	生食 1.2mL	皮下注

【当日の投与方法】

《Day1,15》

投与間隔》

投与順番》
 ダラキューロ開始 1～3 時間前に服用
 ・アセトアミノフェン 500mg 2T
 ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg 1T
 ・レナデックス 4mg 5T
 (皮下注) (皮下注)
 ① → ② → 終了

《Day8,22》

投与間隔》

投与順番》
 ベルケイド投与前に服用
 ・レナデックス 4mg 5T
 (皮下注)
 ② → 終了

【備考】

①※臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に、本剤 15mL を約 3～5 分かけて投与する。

・70 歳を超える、過少体重 (BMI : 18.5kg/m²未満)、糖尿病の場合は、デキサメタゾンを 20mg/週で投与可。

・エンドキサンの最大週間投与量は、体表面積にかかわらず 500mg/body。

・エンドキサンは点滴投与へ変更可 (生食 250mL に溶解し、1 時間で投与)。