

レジメン番号	0495	レジメン名	GCD±R
登録診療科	血液内科	使用薬剤	リツキサン/リツキシマブ BS、ジェムザール、カルボプラチン、デキサート/レナデックス
がん腫	悪性リンパ腫	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	2~4	Day8 ( / )	・・・Day21	Day1 ( / )
リツキサン/リツキシマブ BS 375 mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg			(↓)	3 週間を 1 コース	
ジェムザール(GEM) 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓		↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓				↓
デキサート/デカドロン 40mg/日	点滴 または経口		↓	↓			↓

(支持療法)

※1 Day8 経口剤あり

A) パロノセトロン(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑		↑	3 週間を 1 コース	↑
-----------------------------------	----	-----------	---	--	---	----------------	---

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①リツキサン/リツキシマブ BS	100mg	生食で 10 倍希釈	※2 下記参照/輸注ポンプ
	500mg		
②ジェムザール	200mg	生食 100mL	30 分/点滴
	1000mg		
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60 分/点滴
	150mg		
④デキサート	3.3mg	生食 100ml	30 分/点滴
⑤	パロノセトロン(day1 のみ選択可)	生食 100ml	15 分/点滴
	グラニセトロン		
⑥ 生食	50mL		5 分/点滴

(day1) 投与時間≫ (メインルート/持続) (側管/15 分) (側管/30 分) (側管 30 分) (側管/60 分) (側管/5 分)  
投与順≫ ⑦※3 → ⑤ → ④ → ② → ③ → ⑥ → 終了

(day8) 投与時間≫ (メインルート/持続) (側管/15 分) (側管/30 分) (側管/5 分)  
リツキサンあり 投与順≫ ⑧※3 → ① → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

(day8) 投与時間≫ (メインルート/持続) (側管/15 分) (側管/30 分) (側管/5 分)  
リツキサンなし 投与順≫ ⑧※3 → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【備考】

※1 リツキサン/リツキシマブ BS 投与前、解熱鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※2 初回投与時は、最初の 30 分は 50mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、その後注入速度を 30 分毎 に 50mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで速度を上げることができる。

また、2 回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発 現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて開始し、その後 30 分毎に 100mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで上げることができる。

※3 メインルート：⑦KN3 号 500mL ⑧生食 AY500mL