

レジメン番号	0731	レジメン名	IsaKd 療法 初回サイクル
登録診療科	血液内科	使用薬剤	カイプロリス、サークリサ
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day8 (/)	Day9 (/)	Day15 (/)	Day16 (/)	Day22 (/)	Day23 (/)	…Day28
カイプロリス 20mg/m ²	点滴	mg	↓	↓							4 週間を 1 クール
カイプロリス 56mg/m ²	点滴	mg			↓	↓	↓	↓			
サークリサ 10mg/kg	点滴	mg	↓		↓		↓		↓		
デキサート 20mg/body	点滴	mg	↓ (20mg)	↓ (20mg)	↓ (20mg)	↓ (20mg)	↓ (20mg)	↓ (20mg)	↓ (20mg)		
レナデックス 20mg/kg	内服									↓ (20mg)	

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① カイプロリス	10mg	5%ブドウ糖 100mL (10mg は 1V5ml, 40mg は 1V20ml 注射用水で溶解)	30 分/点滴
	40mg		
② サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	輸注ポンプ
	500mg		
③ デキサート	3.3mg	5%ブドウ糖 100ml	15 分/点滴
④ デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴
⑤ 生食	50mL		5 分/点滴

【当日の投与方法】

《Day1.8.15.》 前投薬内服確認 (※: 下記参照)

投与間隔>> (メインルート) (15分) (30分) (※※) (5分)
 投与順番>> ⑥ → ③ → ① → ② → ⑤ → 終了

《Day2.9.16.》

投与間隔>> (メインルート) (15分) (30分) (5分)
 投与順番>> ⑦ → ③ → ① → ⑤ → 終了

《Day22》 前投薬内服確認 (※: 下記参照)

投与間隔>> (メインルート) (15分) (※※) (5分)
 投与順番>> ⑧ → ④ → ② → ⑤ → 終了

【備考】

⑥5%ブドウ糖 250mL(メインルート) (Day1・8・15) ⑦5%ブドウ糖 100mL(メインルート) (Day2・9・16)

⑧生食 250mL(メインルート) (Day22)

③、④デキサメタゾンが必要なに応じて内服へ変更可

※アセトアミノフェン 1000 mg、クロルフェニラミン 6 mg、ファモチジン 20mg を

サークリサ開始 15~60 分間前に前投与

※※ 投与速度は非常に複雑のため、メーカー作成の換算表を参照