

レジメン番号	0016	レジメン名	EC
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	エピルビシン、エンドキサン
がん腫	乳癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	・・・Day21	Day1 ( / )
エピルビシン(EPI) 90mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
エンドキサン(CPA) 600mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

アロカリス 235mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	mg	↑		↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エピルビシン	10mg	生食 100mL	10分/点滴
	50mg		
②エンドキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
	500mg		
③	アロカリス 235mg	生食 100mL	30分/点滴
	パロノセトロン 0.75mg		
	デキサート 3.3mg		
④生食	50ml		5分/点滴

投与間隔≫ (30分) (10分) (30分) (5分)  
 投与順番≫ ③ → ① → ② → ④ → 終了

【備考】

③アロカリス：内服アプレピタント（day1 125mg、day2以降 80mg）使用の場合は投与しない