

| | | | |
|--------|----------|----------|---------------------|
| レジメン番号 | 0313 | レジメン名 | TC(PTX+CBDCA)(AUC6) |
| 登録診療科 | 産婦人科 | 使用薬剤 | パクリタキセル、カルボプラチン |
| がん腫 | 卵巣癌・子宮体癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | …Dya21 | Day1 (/) |
|--------------------------------------|------|-------|---------------|----------|---------------|
| パクリタキセル(PTX) 175mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | 3週間を1コース | ↓ |
| カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6: Calvert 式) | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | |
|---|----|---------|---|----------|---|
| デキサート 19.8mg/body | 点滴 | 19.8mg | ↑ | 3週間を1コース | ↑ |
| ファモチジン 20mg/body | 点滴 | 20mg | ↑ | | ↑ |
| ネオレスタール 10mg/body | 点滴 | 10mg | ↑ | | ↑ |
| A) パロノセトロン 0.75mg/body B) グラニセトロン 1mg/body | 点滴 | を mg | ↑ | | ↑ |
| アロカリス 235mg/body | 点滴 | 235mg | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|----------|---------|----------|---------|
| ①パクリタキセル | 30mg | 生食 500mL | 3時間/点滴 |
| | 100mg | | |
| ②カルボプラチン | 50mg | 生食 250mL | 60分/点滴 |
| | 150mg | | |
| ③ | デキサート | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | ファモチジン | | |
| | ネオレスタール | | |
| ④ | パロノセトロン | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| | グラニセトロン | | |
| | アロカリス | | |
| ⑤生食 | 50mL | | 5分/点滴 |
| ⑥生食 | 50mL | | 5分/点滴 |

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分) (3時間) (60分) (5分)

投与順番≫ ③ → ④ → ⑤ → ① → ② → ⑥ → 終了

【備考】

④アロカリス：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない

