

| | | | |
|--------|-------|----------|--------------------------|
| レジメン番号 | 0557 | レジメン名 | CBDCA+ETP+アテゾリズマブ |
| 登録診療科 | 呼吸器内科 | 使用薬剤 | カルボプラチン、エトポシド、 テセントリク |
| がん腫 | 小細胞肺癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day2 (/) | Day3 (/) | …Day21 | Day1 (/) |
|---------------------------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| テセントリク 1200mg/body | 点滴 | mg | ↓ | | | 3週間を1コース | ↓ |
| エトポシド (VP-16) 100mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | | ↓ |
| カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式) | 点滴 | mg | ↓ | | | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | | | |
|------------------------|----|--------|---|---|---|----------|---|
| パロノセトロン 0.75mg/body | 点滴 | 0.75mg | ↑ | | | 3週間を1コース | ↑ |
| デキサート 9.9mg/body | 点滴 | 9.9mg | ↑ | | | | ↑ |
| デキサート 6.6mg/body | 点滴 | 6.6mg | | ↑ | ↑ | | |
| アロカリス 235mg/body | 点滴 | 235mg | ↑ | | | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|----------|---------|--------------|----------|
| ①テセントリク | 1200mg | 生食 250mL | ※下記参照/点滴 |
| ②エトポシド | 100mg | 生食 500mL | 90分/点滴 |
| ③カルボプラチン | 50mg | 生食 250mL | 60分/点滴 |
| | 150mg | | |
| ④ | パロノセトロン | 0.75mg | 生食 100mL |
| | アロカリス | Day1 235mg | |
| | デキサート | Day1 3.3mg | |
| | デキサート | Day2,3 3.3mg | |
| ⑤生食 | 100mL | | 15分/点滴 |
| ⑥生食 | 50mL | | 5分/点滴 |
| ⑦生食 | 50mL | | 5分/点滴 |

(Day1)

投与間隔>> (15分) (※) (5分) (30分) (90分) (60分) (5分)

投与順番>> ⑤ → ① → ⑥ → ④ → ② → ③ → ⑦ → 終了

(Day2,3)

投与間隔>> (15分) (90分) (5分)

投与順番>> ④ → ② → ⑦ → 終了

【備考】

※テセントリク投与速度 初回 60分/2回目以降 30分

アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) またはアロカリス 235mg を併用