

レジメン番号	0578	レジメン名	頸癌 TC 療法
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	パクリタキセル、カルボプラチン
がん腫	子宮頸癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 175mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

支持療法

デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
A) パロノセトロン 0.75mg/body B) グラニセトロン 1mg/body	点滴	を mg	↑		↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル	30mg	生食 500mL	3 時間/点滴
	100mg		
②カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
③	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ファモチジン 20mg		
	ネオレスタール 10mg		
④	パロノセトロン 0.75mg	生食 100mL	30 分/点滴
	グラニセトロン 1mg		
	アロカリス 235mg		
⑤生食	50mL		5 分/点滴
⑥生食	50mL		5 分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分) (3時間) (60分) (5分)

投与順番≫ ③ → ④ → ⑤ → ① → ② → ⑥ → 終了

【備考】

④アロカリス：内服アプレピタント (day1 125mg、day2以降80mg) 使用の場合は投与しない