

| | | | |
|--------|-------|----------|------------------------|
| レジメン番号 | 0627 | レジメン名 | CDDP+ETP+デュルバルマブ |
| 登録診療科 | 呼吸器内科 | 使用薬剤 | シスプラチン、エトポシド イミフィンジ |
| がん腫 | 小細胞肺癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day2 (/) | Day3 (/) | ・・・Day21 | Day1 (/) |
|---------------------------------|------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| イミフィンジ 1500mg/body | 点滴 | mg | ↓ | | | 3週間を1コース | ↓ |
| エトポシド(ETP) 100mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | | ↓ |
| シスプラチン(CDDP)80mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | | | ↓ |
| (支持療法) | | | | | | | |
| パロノセトロン 0.75mg/body | 点滴 | 0.75mg | ↑ | | | 3週間を1コース | ↑ |
| デキサート 9.9mg/body | 点滴 | 9.9mg | ↑ | | | | ↑ |
| デキサート 6.6mg/body | 点滴 | 6.6mg | | ↑ | ↑ | | ↑ |
| 硫酸マグネシウム 20mL 0.4A/body | 点滴 | 0.4A | ↑ | | | | ↑ |
| マンニトール S 200mL/body | 点滴 | 200mL | ↑ | | | | ↑ |
| アロカリス 235mg/body | 点滴 | 235mg | ↑ | | | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-----------|----------------|----------|---------|
| ①イミフィンジ | 120mg | 生食 100mL | 60分/点滴 |
| | 500mg | | |
| ②エトポシド | 100mg | 生食 500mL | 90分/点滴 |
| ③シスプラチン | 10mg | 生食 300mL | 60分/点滴 |
| | 25mg | | |
| | 50mg | | |
| ④ | パロノセトロン 0.75mg | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| | デキサート 3.3mg | | |
| | アロカリス 235mg | | |
| ⑤デキサート | 3.3mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| ⑥生食 | 100mL | | 15分/点滴 |
| ⑦生食 | 50mL | | 5分/点滴 |
| ⑧硫酸マグネシウム | 20mL | 生食 500mL | 60分/点滴 |
| ⑨マンニトール S | 300mL | | 30分/点滴 |
| ⑩生食 | 500mL | | 60分/点滴 |
| ⑪生食 | 50mL | | 5分/点滴 |

《Day1》

投与時間≫ (15分) (60分) (5分) (30分) (90分)

投与順番≫ ⑥ → ① → ⑦ → ④ → ② →

(60分) (30分) (60分) (60分)

⑧ → ⑨ → ③ → ⑩ → 終了

《Day2,3》

投与時間≫ (15分) (90分) (5分)

投与順番≫ ⑤ → ② → ⑪ → 終了

【備考】

体重 30kg 以下の時は、「CDDP+ETP+デュルバルマブ ≤30kg 【0632】」を使用すること

④アロカリス：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない