

レジメン番号	0677	レジメン名	CBDCA+PTX+ペムブロリズマブ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、パクリタキセル キイトルーダ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
パクリタキセル(PTX) 200mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6: Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

支持療法

デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30分/点滴
②パクリタキセル	30mg	生食 500mL	180分/点滴
	100mg		
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
④	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン 20mg		
	ネオレスタール 10mg		
⑤	グラニセトロン 1mg	生食 100mL	30分/点滴
	アロカリス 235mg		
⑥生食	100mL		15分/点滴
⑦生食	50mL		5分/点滴
⑧生食	50mL		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分) (15分) (30分) (180分) (60分) (5分)

投与順番≫ ⑥ → ① → ⑦ → ④ → ⑤ → ② → ③ → ⑧ → 終了

【備考】

・内服アプレピタントカプセル (day1 125mg、day2 以降 80mg)、またはアロカリス 235mg 併用