

レジメン番号	0760	レジメン名	TC+ペムプロリズマブ+アバスチン
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	パクリタキセル、カルボプラチン キイトルーダ、アバスチン
がん腫	子宮頸癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Dya21	Day1 (/)
ペムプロリズマブ (Pembro) 200mg/body	点滴	200mg	↓	3週間を1コース	↓
ベバシズマブ (Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓
パクリタキセル(PTX) 175mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

【支持療法】

デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
A) パロノセトロン 0.75mg/body B) グラニセトロン 1mg/body	点滴	を mg	↑		↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	200mg	生食 100mL	30分/点滴
②アバスチン	100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
	400mg		
③パクリタキセル	30mg	生食 500mL	3時間/点滴
	100mg		
④カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
⑤	デキサート	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン		
	ネオレスタール		
⑥	パロノセトロン	生食 100mL	30分/点滴
	グラニセトロン		
	アロカリス		
⑦生食	100mL		15分/点滴
⑧生食	50mL		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分) (※下記参照) (15分) (30分) (5分)

投与順番≫ ⑦ → ① → ⑧ → ② → ⑤ → ⑥ → ⑧ →

(3時間) (60分) (5分)
③ → ④ → ⑧ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分

⑤アロカリス：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない