

レジメン番号	0768	レジメン名	デュルバルマブ+GEM+CDDP
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	イミフィンジ、ジェムザール、シスプラチン
がん腫	胆道癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	…Day21	Day1 (/)
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	1500mg	↓		3週間を1コース	↓
シスプラチン(CDDP) 25mg/m ²	点滴	mg	↓	↓		↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)パロノセトロン(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	8mEq	↑	↑		↑
ラシックス 0.5A/body	点滴	10mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① イミフィンジ	120mg	生食 100ml	60分/点滴
	500mg		
② ジェムザール	200mg	生食 100ml	30分/点滴
	1000mg		
③ シスプラチン	10mg	生食 400ml	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
④ パロノセトロン または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100ml	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
⑤ 硫酸マグネシウム	20ml	生食 500ml	60分/点滴
⑥ ラシックス	20mg	生食 250ml	30分/点滴
⑦ 生食	100mL		15分/点滴
⑧ 生食	50ml		5分/点滴
⑨ 生食	500ml		60分/点滴

【Day1】

投与間隔>> (15分) (60分) (5分) (15分) (30分) (60分)

投与順番>> ⑦ → ① → ⑧ → ④ → ② → ⑤ → (30分) (60分) (60分)

【Day8】 ⑥ → ③ → ⑨ → 終了

投与間隔>> (15分) (30分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番>> ④ → ② → ⑤ → ⑥ → ③ → ⑨ → 終了

【備考】

・最大8サイクルまで、以降はイミフィンジ維持療法へ。