

| | | | |
|--------|------|----------|-------------------------|
| レジメン番号 | 0777 | レジメン名 | AC+ペムブロリズマブ |
| 登録診療科 | 乳腺外科 | 使用薬剤 | ドキソルビシン、エンドキサン、ペムブロリズマブ |
| がん腫 | 乳癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 患者投与量 | 投与方法 | Day1 (/) | ・・・Day21 | Day1 (/) |
|-------------------------------------|-------|------|---------------|----------|---------------|
| キイトルーダ 200mg/body | mg | 点滴 | ↓ | 3週間を1コース | ↓ |
| ドキソルビシン(DXR) 60mg/m ² | mg | 点滴 | ↓ | | ↓ |
| エンドキサン(CPA) 600mg/m ² | mg | 点滴 | ↓ | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | |
|------------------------|----|----|---|----------|---|
| アロカリス 235mg/body | mg | 点滴 | ↑ | 3週間を1コース | ↑ |
| パロノセトロン 0.75mg/body | mg | 点滴 | ↑ | | ↑ |
| デキサート 9.9mg/body | mg | 点滴 | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|----------|-------------------|----------|---------|
| ①キイトルーダ | 200mg | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| ②ドキソルビシン | 10mg | 生食 100mL | 10分/点滴 |
| | 50mg | | |
| ③エンドキサン | 100mg | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| | 500mg | | |
| ④ | アロカリス 235mg | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| | パロノセトロン 0.75mg | | |
| | デキサート 3.3mg | | |
| ⑤生食 | 100mL | | 15分/点滴 |
| ⑥生食 | 50ml | | 5分/点滴 |

投与間隔>> (15分) (30分) (5分) (30分)

投与順番>> ⑤ → ① → ⑥ → ④ →

(10分) (30分) (5分)
② → ③ → ⑥ → 終了

【備考】

④アロカリス：内服アプレピタント（day1 125mg、day2以降 80mg）使用の場合は投与しない

4サイクル実施