

レジメン番号	0563	レジメン名	CBDCA+nab-PTX(胸腺癌)
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、アブラキサン
がん腫	胸腺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	・ ・ Day21	Day1 (/)
アブラキサン(nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	3週間を1コース	↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6 : Calvert 式)	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑	3週間を1コース	↑
A) パロノセトロン 0.75mg/body B) グラニセトロン 1mg/body	点滴	を mg	↑				↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg		↑	↑		
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑				↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アブラキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
②カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
③	パロノセトロン または グラニセトロン	生食 100ml	30分/点滴
	デキサート		
	アロカリス		
	3.3mg		
④	グラニセトロン	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート		
⑤ 生食	50ml		5分/点滴

(day1)

投与間隔≫

(30分) (5分) (30分) (5分) (60分) (5分)

投与順番≫ ③ → ⑤ → ① → ⑤ → ② → ⑤ → 終了

(day8、15)

投与間隔≫

(15分) (5分) (30分) (5分)

投与順番≫ ④ → ⑤ → ① → ⑤ → 終了

【備考】

③アロカリス：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない