

| | | | |
|--------|-------|----------|------------------|
| レジメン番号 | 0754 | レジメン名 | Pola-R-CHP(C7-8) |
| 登録診療科 | 血液内科 | 使用薬剤 | リツキサン/リツキシマブ BS |
| がん腫 | DLBCL | インターバル日数 | 21 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | …Day21 | Day1 (/) |
|---|------|-------|---------------|----------------|---------------|
| リツキサン/リツキシマブ BS 375mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | 3 週間を 1 コース | ↓ |

《薬剤調製》

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|
| ③ リツキサン/リツキシマブ BS | 100mg | 生食 | 医師の指示通り ※下記参照/ 輸注ポンプ |
| | 500mg | 初回：1mg/ml に希釈 2 回目～：1~4mg/ml に希釈 | |
| ⑥ 生食 | 50mL | | 5 分/点滴 |

【Day1】 ※※※前投薬内服確認

投与間隔> (メインルート/持続) (※/側管) (5 分/側管)
 投与順番> ③ → ① → ② → 終了

【備考】

⑦生食 500mL (メインルート)

③※リツキサン投与速度：初回投与時、最初の 30 分は 50mg/hr で開始し、患者の状態を確認しながら、
 注入速度を 30 分毎に 50mg/hr ずつ上げて、最大 400mg/hr まで速度を上げることができる。

2 回目以降の投与速度は下記のいずれかを選択可能 (リツキシマブ BS は(2)を選択不可)

(1) 初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/hr で開始し、その後 30 分毎に 100mg/hr ずつ上げて、
 最大 400mg/hr まで上げることができる

(2)臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が
 5000/μL 未満である場合、90 分で投与 (最初の 30 分：投与量の 20%、その後 60 分：投与量の 80%)

※※※リツキサン/リツキシマブ BS 開始 30 分前にアセトアミノフェン錠 500mg、クロルフェニラミン TR 錠 6mg を
 服用する。