

レジメン番号	0755	レジメン名	Pola-R-CHP 分割(C1-6)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	リツキサン/リツキシマブ BS、ポライビー、ドキシソルビシン、エンドキサン、プレドニゾロン
がん腫	DLBCL	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	Day6 (/)	… Day21	Day1 (/)
リツキサン/リツキシマブ BS 375mg/m ²	点滴	mg	↓						3 週間を 1 コース	↓
ドキシソルビシン 50mg/m ²	点滴	mg		↓						
エンドキサン 750mg/m ²	点滴	mg		↓						
ポライビー 1.8mg/kg	点滴	mg		↓						
プレドニゾロン 100mg/body	内服	mg		↓	↓	↓	↓	↓		

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① リツキサン/リツキシマブ BS	100mg	生食	医師の指示通り ※下記参照/ 輸注ポンプ
	500mg	初回：1mg/ml に希釈 2 回目～：1~4mg/ml に希釈	
② ドキシソルビシン	10mg	生食 100ml	15 分/点滴
	50mg		
③ エンドキサン	100mg	生食 250ml	60 分/点滴
	500mg		
④ ポライビー	30mg	生食 100ml	※※下記参照/点滴
	140mg		
⑤ グラニセトロン	1mg	生食 100ml	15 分/点滴
⑥ 生食	50mL		5 分/点滴

【Day1】 ※3.前投薬内服確認

投与間隔>> (メインルート/持続) (※/側管) (5分/側管)
 投与順番>> ⑦ → ① → ⑥ → 終了

【Day2】 ※4.前投薬内服確認

投与間隔>> (メインルート/持続) (15分/側管) (15分/側管) (60分/側管) (※※/側管) (5分/側管)
 投与順番>> ⑦ → ⑤ → ② → ③ → ④ → ⑥ → 終了

【備考】

⑦生食 500mL (メインルート)

③※リツキサン投与速度：初回投与時、最初の 30 分は 50mg/hr で開始し、患者の状態を確認しながら、注入速度を 30 分毎に 50mg/hr ずつ上げて、最大 400mg/hr まで速度を上げることができる。

2 回目以降の投与速度は下記のいずれかを選択可能 (リツキシマブ BS は(2)を選択不可)

(1) 初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/hr で開始し、その後 30 分毎に 100mg/hr ずつ上げて、最大 400mg/hr まで上げることができる

(2)臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が 5000/ μ L 未満である場合、90 分で投与 (最初の 30 分：投与量の 20%、その後 60 分：投与量の 80%)

④※※ポライビー投与速度：初回 90 分、2 回目以降 30 分まで短縮可

※3. リツキサン/リツキシマブ BS 開始 30 分前にアセトアミノフェン錠 500mg、クロルフェニラミン TR 錠 6mg を服用する。

※4. ポライビー開始 1 時間前に PSL100mg、30 分前にアセトアミノフェン錠 500mg、クロルフェニラミン TR 錠 6mg を服用する。