

レジメン番号	0237	レジメン名	VMP(ベルケイド点滴)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ベルケイド、アルケラン、プレドニゾン
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	35日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )		Day4	Day8 ( / )	Day15 ( / )	Day22 ( / )	1クール 35日	Day1 ( / )
ベルケイド 1.3mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓			↓	↓	↓		↓
アルケラン 8mg/m <sup>2</sup>	経口	mg	↓	↓↓	↓					↓
プレドニゾン 60mg/m <sup>2</sup> ※1	経口	mg	↓	↓↓	↓					↓

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ベルケイド	3mg	生食 50mL	5分/点滴
② 生食	100ml		15分/点滴
③ 生食	50ml		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (5分) (5分)  
 投与順番≫ ② → ① → ③ → 終了

【備考】

※1 PSLは70歳以上の高齢者では原則40mg/m<sup>2</sup>に減量する。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---