

レジメン番号	0238	レジメン名	VMD(ベルケイド点滴)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ベルケイド、アルケラン、デキサート
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	35日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day4	Day8 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	1クール 35日	Day1 (/)
ベルケイド 1.3mg/m ²	点滴	mg	↓			↓	↓	↓		↓
アルケラン 8mg/m ²	経口	mg	↓	↓↓	↓					↓
デキサート ※1 20mg/body	点滴	20mg	↓			↓	↓	↓		↓

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ベルケイド	3mg	生食 50ml	5分/点滴
② デキサート	3.3mg	生食 100ml	15分/点滴
③ 生食	50ml		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (5分) (5分)
 投与順番≫ ② → ① → ③ → 終了

【備考】

※1 DEX は病気進行に応じて、Day2、Day9 も追加投与可能。

また、点滴に代えて経口のレナデックスで代用しても良い。