

レジメン番号	0278	レジメン名	GDP
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ジェムザール、シスプラチン、デキサート
がん腫	再発・難治ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫	インターバル 日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ジェムザール (GEM) 1000mg/m ² /日	点滴	mg	↓	↓	3週間を 1コース	↓
シスプラチン (CDDP) 75mg/m ² /日	点滴	mg	↓			↓

(支持療法)

デキサート 33mg/body	点滴	33mg	↑		3週間を 1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg	点滴	0.75mg	↑	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.5A/body	点滴	0.5A	↑			↑
20%マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg	生食 100mL	30分/点滴
	1000mg		
②シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
③ アロキシ デキサート (day1)	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	3.3mg		
④ 硫酸マグネシウム	1mEq/mL 20mL	KN3号 500mL	60分/点滴
⑤ 20%マンニトール	300mL		30分/点滴
⑥ KN3号	500mL		60分/点滴
⑦ KN3号	500mL		60分/点滴

(day1)

投与間隔≫ (60分メインルート) (15分側管) (60分側管) (30分メインルート) (60分メインルート) (60分メインルート) (60分メインルート)

投与順番≫ ④ → ③ → ① → ⑤ → ② → ⑥ → ⑦ → 終了

(day8)

投与間隔≫ (15分) (30分)

投与順番≫ ③ → ① → 終了

【備考】

.....

.....

.....