

レジメン番号	0279	レジメン名	C-MOPP
登録診療科	血液内科	使用薬剤	エンドキサン、オンコビン、 プレドニゾン、塩酸プロカルバジン
がん腫	ホジキンリンパ腫	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day28	Day1 (/)	
エンドキサン(CPA) 500mg/m ² /日	点滴	mg	↓	↓		4週間を 1コース	↓	
オンコビン(VCR) 1.0mg/m ² /日(最大2mg/body/日)	静注	mg	↓	↓			↓	
プレドニゾン(PSL) 40mg/m ² /日	経口	mg	Day1~14まで服用					↓
塩酸プロカルバジン(PCZ) 100mg/m ² /日	経口	mg						

(支持療法)

A)パロノセトロン(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	↑		4週間を 1コース	↑
---------------------------------	----	-----------	---	---	--	--------------	---

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エンドキサン	100mg	KN3号 500ml	120分/点滴
	500mg		
②オンコビン	1mg	生食 20ml	静注
③ パロノセトロン(0.75) または グラニセトロン(1)	0.75mg	生食 100ml	15分/点滴
	1mg		
④メイロン	20ml	KN3号 500ml	メインルート

投与間隔≫ (メインルート) (15分/側管) (静注) (120分/側管)

投与順番≫ ④ → ③ → ② → ① → 終了

【備考】

※1 ④メインルート：KN3号 500mL+メイロン 20mL(2A)、上記はすべて側管から投与する。
