

レジメン番号	0424	レジメン名	THP-COP
登録診療科	血液内科	使用薬剤	エンドキサン、ピノルビン、オンコビン、プレドニゾロン
がん腫	悪性リンパ腫	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
エンドキサン(CPA) 750mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を 1コース	↓
ピノルビン(THP-DXR) 50mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
オンコビン(VCR) 1.4mg/m ² (最大 2mg/body)	点滴	mg	↓		↓
プレドニゾロン(PSL) 100mg/body または 50mg/m ²	経口	mg	D1~5		D1~5
(支持療法)					
A) パロノセトロン (0.75mg) B) グラニセトロン (1mg)	点滴	○ を mg	↑	3週間を 1コース	↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エンドキサン	100mg	KN3号 500mL	120分/点滴
	500mg		
②ピノルビン	10mg	5%ブドウ糖 250mL	60分/点滴
③オンコビン	1mg	生食 50ml	5分/点滴
④	パロノセトロン	生食 100ml	15分/点滴
	または グラニセトロン		

投与間隔≫ ※1 (メインルート/持続) (側管 15分) (側管 5分) (側管 60分) (側管 120分)
 投与順番≫ ⑦ → ④ → ③ → ② → ① → 終了

【備考】

※1 ⑦メインルート：KN3号 500mL+メイロン 20mL(2A)、上記はすべて側管から投与する。
