

レジメン番号	0458	レジメン名	Kd 療法 初回サイクル
登録診療科	血液内科	使用薬剤	カイプロリス、デキサート/レナデックス
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2 ( / )	Day8	Day9	Day15 ( / )	Day16 ( / )	Day22 ( / )	Day23 ( / )	4 週間を 1 コース
カイプロリス 20mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓							
カイプロリス 56mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg			↓	↓	↓	↓			
デキサート/ レナデックス※2 20mg(適宜減量)	点滴 または 経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①カイプロリス	10mg	5%ブドウ糖 100mL (10mg は 1V5ml、40mg は 1V20ml 注射用水で溶解)	30 分/点滴
	40mg		
②デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴

投与間隔≫ ③※1 (メインルート/持続) ② (15分) ① (30分) 終了

【備考】

※1 ③5%ブドウ糖 100mL(メインルート) (Day1・2・8・9・15・16)

※2 デキサメタゾン(20mg)は点滴(デキサート)または経口(レナデックス) Day22・23 は経口