

レジメン番号	0726	レジメン名	Isa d 療法 2 サイクル以降
登録診療科	血液内科	使用薬剤	サークリサ、デキサート、レナデックス
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	…Day28	Day1 (/)
サークリサ 20mg/kg	点滴	mg	↓		↓		4 週間を 1 コース	↓
デキサート 40mg/body	点滴 ※3	mg	↓		↓			↓
レナデックス 40mg/日	経口	mg		↓		↓		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	※2 輸注ポンプ
	500mg		
② デキサート	3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴
③ 生食	50mL		5 分/点滴

投与間隔≫

※1 (メインルート/持続) (15 分)

投与順番≫

開始 15～60 分間前に服用
 ・アセトアミノフェン 500mg 2T
 ・ホパラミン錠 2mg 1T
 ・ファモチジン OD20mg 1T

④ → ② → ① → ③ → 終了

【備考】

※1 ③生食 250mL(メインルート)

※2 投与速度は非常に複雑のため、メーカー作成の換算表を参照

※3 デキサメタゾンは必要に応じて内服へ変更可。