

レジメン番号	0845	レジメン名	ペムブロリズマブ+GEM+CDDP
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	キイトルーダ、ジェムザール、シスプラチン
がん腫	胆道癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
キイトルーダ 200mg/body	点滴	200mg	↓		3週間を1コース	↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓
シスプラチン (CDDP) 25mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)パロセトロン(0.75) B)گرانセトロン(1)	点滴	○を mg	↑	↑	3週間を1コース	↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	↑		↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	9.9mg	↑	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑	↑		↑
ラシックス 0.5A/body	点滴	0.5A	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	200mg	生食 100mL	30分/点滴
②ジェムザール	200mg	生食 100mL	30分/点滴
	1000mg		
③シスプラチン	10mg	生食 400mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
④ パロセトロン または گرانセトロン デキサート アロカリス	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
	235mg		
⑤硫酸マグネシウム	20mL	生食 500mL	60分/点滴
⑥ラシックス	20mg	生食 250mL	30分/点滴
⑦生食	100mL		15分/点滴
⑧生食	50mL		5分/点滴
⑨生食	500mL		60分/点滴

【Day1】

投与間隔>> (15分) (30分) (5分) (30分) (30分) (60分)

投与順番>> ⑦ → ① → ⑧ → ④ → ② → ⑤ → ⑥ → ③ → ⑨ → 終了

【Day8】

投与間隔>> (15分) (30分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番>> ④ → ② → ⑤ → ⑥ → ③ → ⑨ → 終了

【備考】

キイトルーダ：最大8サイクルまで、以降はイミフィンジ維持療法へ。