

レジメン番号	0837	レジメン名	ゾルハツキシマブ+XELOX
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	ビロイ、エルプラット、ゼローダ
がん腫	胃癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day 2~14	…Day21	Day1 ( / )
エルプラット(I-OHP) 130mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓			↓
ゼローダ 2000mg/m <sup>2</sup> /日※	内服	mg	↓	↓	3週間を1コース	↓
ビロイ (ゾルハツキシマブ) 初回 800mg/m <sup>2</sup> /日 以降 600mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓			↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑			↑
ネオレスター <sup>ル</sup> 10mg/body	点滴	10mg	↑			↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① エルプラット	100mg	5%グリコ糖 500mL	120分/点滴
デキサート	1.65mg		
② ネオレスター <sup>ル</sup>	10mg	5%グリコ糖 100mL	15分/点滴
デキサート	3.3mg		
デキサート	1.65mg		
③ アロカリス	235mg	生食 100mL	30分/点滴
パロノセトロン	0.75mg		
④ 生食	50mL		15分/点滴
⑤ ビロイ	100mg	生食(2.0mg/mLとなるように希釈)	※/点滴
⑥ 生食	50mL		5分/点滴

投与間隔》

(15分) (30分) (※) (5分) (120分) (15分)

② → ③ → ⑤ → ⑥ → ① → ④ → 終了

投与順番》

【備考】 CLDN18.2陽性、HER2陰性であることを確認。

※ゼローダ：1日2回 2週間内服、1週間休薬

※ビロイ投与速度：2時間以上かけて投与。

初回投与：50mL/h(30分)→100mL/h(30分)→200mL/h(30分)→300mL/h(最後まで)

2回目以降：100mL/h(60分)→200mL/h(最後まで)