

レジメン番号	0847	レジメン名	ペムブロリズマブ+XELOX
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	キイトルーダ、ゼローダ、エルプラット
がん腫	胃癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 2~14	…Day21	Day1 (/)
エルプラット(I-OHP) 130mg/m ² /日	点滴	mg	↓		3週間を1コース	↓
ゼローダ 2000mg/m ² /日※	内服	mg	↓	↓		↓
キイトルーダ 200mg/body/日	点滴	200mg	↓			↓

(支持療法)

A) パロニセトロン(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑		3週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① エルプラット	100mg	5%ピトウ糖 500mL	120分/点滴
デキサート	1.65mg		
② パロノセトロン グラニセトロン または デキサート	0.75mg	5%ピトウ糖 100mL	15分/点滴
	1mg		
③ 生食	3.3mg		15分/点滴
	1.65mg		
④ 生食	50mL		
⑤ キイトルーダ	100mL		
⑥ 生食	100mg	生食 100mL	30分/点滴
	50mL		5分/点滴

投与間隔》

(15分) (30分) (5分) (15分) (120分) (15分)

④ → ⑤ → ⑥ → ② → ① → ③ → 終了
投与順番》

【備考】

※ゼローダ：1日2回 2週間内服、1週間休薦