

レジメン番号	0848	レジメン名	ペムブロリズマブ+SOX
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	キイトルーダ、エスワンタイホウ、エルプラット
がん腫	胃癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2～14	…Day21	Day1 (/)
エルプラット(I-OHP) 130mg/m ² /日	点滴	mg	↓		3週間を1コース	↓
エスワンタイホウ(S-1) ※1 下記参照	内服	mg	↓	↓		↓
キイトルーダ 200mg/body/日	点滴	200 mg	↓			↓

(支持療法)

A) パロノセトロン(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑		3週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① 生食	100mL		15分/点滴
② キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30分/点滴
③ 生食	50mL		5分/点滴
④ エルプラット デキサート	100mg 1.65mg	5%ブドウ糖 500mL	120分/点滴
	0.75mg 1mg 3.3mg 1.65mg		
⑤ パロノセトロン グラニセトロン デキサート	50mL	5%ブドウ糖 100mL	15分/点滴
	15分/点滴		
⑥ 生食	50mL		

投与間隔》

(15分) (30分) (5分) (15分) (120分) (15分)

投与順番》 ① → ② → ③ → ⑤ → ④ → ⑥ → 終了

【備考】

・ S-1 : Day1～Day14 に併用 (2週服薬 1週休薬)

※1 S-1 投与量 : BSA 1.25 m²未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m²以上～1.5 m²未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m²以上 → 120mg/day