

レジメン番号	0852	レジメン名	CDDP+PEM+オシメルチニブ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、ペメトレキセド、オシメルチニブ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
シスプラチン(CDDP) 75mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
タグリッソ(オシメルチニブ) 80mg/日	内服	mg		↓↓	↓↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A /body	点滴	0.4A	↑		↑
マンニットール 200mL/body	点滴	200mL	↑		↑

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
②シスプラチン	10mg	生食 300mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
③ パロノセトロン	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
③ デキサート	3.3mg		
③ アロカリス	235mg		
④ 硫酸マグネシウム		生食 500mL	60分/点滴
⑤ マンニットール	200mL		30分/点滴
⑥ 生食	500mL		60分/点滴

投与間隔》 (30分) (10分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番》 ③ → ① → ④ → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【備考】

③アロカリス：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない

オシメルチニブ：1日1回 80mg/日 服用 (休薬なし)

投与7日前よりパンビタン1g/日を連日投与、メチコバール2A筋注を9週に1回行い、投与最終日から22日目まで継続。

4サイクル実施後はPEM+オシメルチニブ維持療法へ移行