

レジメン番号	0862	レジメン名	(術前) CDDP+GEM+ <sup>△</sup> ムブ <sup>△</sup> リズ <sup>△</sup> マブ <sup>△</sup>
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シス <sup>△</sup> ラチ <sup>△</sup> ン+ <sup>△</sup> ゲムシタビン+ <sup>△</sup> ムブ <sup>△</sup> リズ <sup>△</sup> マブ <sup>△</sup>
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

薬品名 投与量/体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	..Day21	Day1 ( / )
キイトルーダ 200mg/body	点滴	200mg	↓		3週間を1コース	↓
ゲムシタビン(GEM) 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓
シスプラチ <sup>△</sup> ン(CDDP) 75mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓			↓
(支持療法)						
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		3週間を1コース	↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg		↑		
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑			↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg		↑		
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑			↑
マンニットール 200mL/body	点滴	200mL	↑			↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑			↑

### 《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30分/点滴
②ゲムシタビン	200mg	生食 100mL	30分/点滴
	1000mg		
③シスプラチ <sup>△</sup> ン	10mg	生食 300mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
④	パロノセトロン 0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	デキサート 3.3mg		
	アロカリス 235mg		
⑤	グラニセトロン 1mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑥	生食 100mL		15分/点滴
⑦	生食 50mL		5分/点滴
⑧	硫酸マグネシウム 20mL	生食 500mL	60分/点滴
⑨	マンニットール 300mL		30分/点滴
⑩	生食 500mL		60分/点滴

(Day1)

投与時間》 (15分) (30分) (5分) (30分) (30分)  
投与順》 ⑥ → ① → ⑦ → ④ → ② →

(Day8)

投与時間》 (15分) (30分) (5分) (60分) (30分) (60分) (60分)  
投与順》 ⑤ → ② → ⑦ → 終了 ⑧ → ⑨ → ③ → ⑩ → 終了

### 【備考】

術前化学療法 4コースまで

④アロカリス: 内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない