

レジメン番号	0866	レジメン名	CBDCA+PEM+アミバントマブ <80kgC1
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチナ、ペメトレキセド、ライブリバント
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【当日の投与方法】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day21
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	3週間を1コース
カルボプラチナ(CBDCA) (AUC=5 : Calvert式)	点滴	mg	↓				
ライブリバント	点滴	mg	↓ 350mg	↓ 1050mg	↓ 1400mg	↓ 1400mg	

支持療法

デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑				3週間を1コース
デキサート 9.9mg/ body	点滴	9.9mg		↑	↑	↑	
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	↑	↑	↑	
ポララミン 5mg/body	点滴	5mg	↑	↑	↑	↑	
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑				
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑				

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
②カルボプラチナ	50mg	5%ブドウ糖液 250mL	60分/点滴
	150mg		
③ライブリバント	350mg	総量 250mL	※下記参照
④ ファモチジン ポララミン デキサート	20mg	生食 100mL	15分/点滴
	5mg		
	3.3mg		
⑤ パロノセトロン アロカリス	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	235mg		
⑥ 生食	100mL		30分/点滴
⑦ 生食	50mL		5分/点滴

Day1
 時間》 (15分) (30分) (10分) (60分) (5分) 下記参照 (5分)
 投与順》 ④ → ⑤ → ① → ② → ⑦ → ③ → ⑦ → 終了

Day2.8.15
 時間》 (15分) (30分) 下記参照 (5分)
 投与順》 ④ → ⑥ → ③ → ⑦ → 終了

【備考】

③アロカリス：内服アプレビタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない

投与 7日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を9週に1回行い、投与最終日から22日目まで継続。

※day1 : 50mL/h、day2 : 33mL/h、day8 : 65mL/h、day15 : 85mL/h の速度で投与する。

day1 は投与開始2時間後 75mL/h へ、day2 は投与開始2時間後 50mL/h へ速度を上げることができる。

ライブリバント：前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用