

レジメン番号	0867	レジメン名	CBDCA+PEM+7ミバ`ンタマブ` <80kgC2
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、ペ`メトレキセド`、ライブ`リバン`ト
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5：Calvert 式)	点滴	mg	↓	
ライブリバン`ド 1400mg/body	点滴	1400mg	↓	

支持療法

デキサート 9.9mg/ body	点滴	9.9mg	↑	3 週間を 1 コース
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	
ポララミン 5mg/body	点滴	5mg	↑	
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg		
②	カルボプラチン	50mg	5%ブドウ糖液 250mL	60 分/点滴
		150mg		
③ライブリバンド		350mg	総量 250mL	125mL/h
④	ファモチジン	20mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ボララミン	5mg		
	デキサート	3.3mg		
⑤	パロノセトロン	0.75mg	生食 100mL	30 分/点滴
	アロカリス	235mg		
⑥	生食	50mL		5 分/点滴



【備考】

投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバル 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、

投与最終日から 22 日目まで継続する。

ライブリバン`ト：前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用