

レジメン番号	0868	レジメン名	CBDCA+PEM+7ミバンタマブ <80kgC3-4
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、ペメトレキセド、ライブリバント
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5：Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓
ライブリバント 1750mg/body	点滴	1750mg	↓		↓

支持療法

デキサート 9.9mg/ body	点滴	9.9mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ポララミン 5mg/body	点滴	5mg	↑		↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド		100mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg		
②カルボプラチン		50mg	5%ブドウ糖液 250mL	60 分/点滴
		150mg		
③ライブリバント		350mg	総量 250mL	125mL/h
④	ファモチジン	20mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ポララミン	5mg		
	デキサート	3.3mg		
⑤	パロノセトロン	0.75mg	生食 100mL	30 分/点滴
	アロカリス	235mg		
⑥	生食	50mL		5 分/点滴

時間≫

投与順≫

④

(15 分)

→

⑤

(30 分)

→

①

(10 分)

→

②

(60 分)

→

⑥

(5 分)

→

③

(125mL/h)

→

⑥

(5 分)

→

終了

【コメント】

投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、

投与最終日から 22 日目まで継続する。

ライブリバント：前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用