

レジメン番号	0869	レジメン名	CBDCA+PEM+アミバンタマブ<80kgC5-
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボ フラチン、ペメトレキセド、ライブリバント
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
ライブリバンド 1750mg/body		1750mg	↓		↓

支持療法

デキサート 9.9mg/ body	点滴	9.9mg	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ポララミン 5mg/body	点滴	5mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド	100mg 500mg	生食 100mL	10 分/点滴
②ライブリバンド	350mg	総量 250mL	125mL/h
③ ファモチジン ポララミン デキサート	20mg	生食 100mL	15 分/点滴
	5mg		
	3.3mg		
④ グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30 分/点滴
⑤ 生食	50mL		5 分/点滴

時間》 時間》
投与順》 ③ → (15分) ④ → (30分) ① → (10分) ⑤ → (5分) ② → (125mL/h) ⑤ → (5分) 終了

【備考】

投与 7日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9週に 1回行い、

投与最終日から 22日目まで継続する。

ライブリバンド：前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用