

|        |        |          |                          |
|--------|--------|----------|--------------------------|
| レジメン番号 | 0870   | レジメン名    | CBDCA+PEM+アミバンタマブ≧80kgC1 |
| 登録診療科  | 呼吸器内科  | 使用薬剤     | カルボプラチン、ペメトレキセド、ライブリバント  |
| がん腫    | 非小細胞肺癌 | インターバル日数 | 21 日                     |

【投与量・投与スケジュール】



| 薬品名<br>投与量／体表面積                      | 投与方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | Day2<br>( / ) | Day8<br>( / ) | Day15<br>( / ) | ・・・Day21    |
|--------------------------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| ペメトレキセド(PEM)<br>500mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | mg    | ↓             |               |               |                | 3 週間を 1 コース |
| カルボプラチン(CBDCA)<br>(AUC=5：Calvert 式)  | 点滴   | mg    | ↓             |               |               |                |             |
| ライブリバンド                              | 点滴   | mg    | ↓ 350mg       | ↓ 1400mg      | ↓ 1750mg      | ↓ 1750mg       |             |

支持療法

|                     |    |        |   |   |   |   |             |
|---------------------|----|--------|---|---|---|---|-------------|
| デキサート 19.8mg/body   | 点滴 | 19.8mg | ↑ |   |   |   | 3 週間を 1 コース |
| デキサート 9.9mg/ body   | 点滴 | 9.9mg  |   | ↑ | ↑ | ↑ |             |
| ファモチジン 20mg/body    | 点滴 | 20mg   | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |             |
| ポララミン 5mg/body      | 点滴 | 5mg    | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |             |
| パロノセトロン 0.75mg/body | 点滴 | 0.75mg | ↑ |   |   |   |             |
| アロカリス 235mg/body    | 点滴 | 235mg  | ↑ |   |   |   |             |

【当日の投与方法】

| 薬品名      |         | 規格     | 希釈液/量         | 投与速度/方法 |
|----------|---------|--------|---------------|---------|
| ①ペメトレキセド |         | 100mg  | 生食 100mL      | 10 分/点滴 |
|          |         | 500mg  |               |         |
| ②カルボプラチン |         | 50mg   | 5%ブドウ糖液 250mL | 60 分/点滴 |
|          |         | 150mg  |               |         |
| ③ライブリバンド |         | 350mg  | 総量 250mL      | ※下記参照   |
| ④        | ファモチジン  | 20mg   | 生食 100mL      | 15 分/点滴 |
|          | ポララミン   | 5mg    |               |         |
|          | デキサート   | 3.3mg  |               |         |
| ⑤        | パロノセトロン | 0.75mg | 生食 100mL      | 30 分/点滴 |
|          | アロカリス   | 235mg  |               |         |
| ⑥        | 生食      | 100mL  |               | 30 分/点滴 |
| ⑦        | 生食      | 50mL   |               | 5 分/点滴  |



【備考】

③アロカリス：内服アプレピタント（day1 125mg、day2 以降 80mg）使用の場合は投与しない

・投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、

投与最終日から 22 日目まで継続する。

※day1：50mL/h、day2：25mL/h、day8：65mL/h、day15：85mL/h の速度で投与する。

day1 は投与開始 2 時間後 75mL/h へ、day2 は投与開始 2 時間後 50mL/h へ速度を上げることができる。

ライブリバント：前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用