

レジメン番号	0871	レジメン名	CBDCA+PEM+アミバンタマブ $\geq$ 80kgC2
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボ プラチン、ペメトレキセド、ライブリバント
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	… Day21
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	3週間を1コース
カルボプラチニ(CBDCA) (AUC=5 : Calvert式)	点滴	mg	↓	
ライブリバント 1750mg/body	点滴	1750mg	↓	

支持療法

デキサート 9.9mg/ body	点滴	9.9mg	↑	3週間を1コース
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	
ポララミン 5mg/body	点滴	5mg	↑	
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
②カルボプラチニ	50mg	5%ブドウ糖液 250mL	60分/点滴
	150mg		
③ライブリバント	350mg	総量 250mL	125mL/h
④ ファモチジン ポララミン デキサート	20mg	生食 100mL	15分/点滴
	5mg		
	3.3mg		
⑤ パロノセトロン アロカリス	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	235mg		
⑥ 生食	50mL		5分/点滴

時間》 ④ (15分) → ⑤ (30分) → ① (10分) → ② (60分) → ⑥ (5分) → ③ (125mL/h) → ⑥ (5分) → 終了  
 投与順》 ④ → ⑤ → ① → ② → ⑥ → ③ → ⑥ → 終了

【コメント】

投与 7日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9週に 1回行い、

投与最終日から 22日目まで継続する。

ライブリバント：前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用