

レジメン番号	0873	レジメン名	CBDCA+PEM+アミバンタマブ≧80kgC5-
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、ペメトレキド、ライブリバント
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ペメトレキド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
ライブリバント 2100mg/body	点滴	2100mg	↓		↓

支持療法

デキサート 9.9mg/ body	点滴	9.9mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ポララミン 5mg/body	点滴	5mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキド		100mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg		
②ライブリバント		350mg	総量 250mL	125mL/h
③	ファモチジン	20mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ポララミン	5mg		
	デキサート	3.3mg		
④	グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30 分/点滴
⑤	生食	50mL		5 分/点滴

時間≫ ③ (15 分) ④ (30 分) ① (10 分) ⑤ (5 分) ② (125mL/h) ⑤ (5 分) 終了
投与順≫ → → → → → →

【コメント】

投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバル 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、
投与最終日から 22 日目まで継続する。

ライブリバント：前投薬としてアセトアミノフェン 1000mg を服用