

レジメン番号	0879	レジメン名	CDDP weekly+ペムプロリズマブ
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	シスプラチニン、キイトルーダ
がん腫	子宮頸癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	・・・ Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	200mg	↓			3週間を 1コースとする	
シスプラチニン(CDDP) 40mg/m ²		mg	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6 mg	↑	↑	↑	3週間を 1コースとする	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	↑	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.5A/body×2	点滴	0.5A	↑	↑	↑		↑
マンニットール 300mL/body	点滴	300mL	↑	↑	↑		↑
KCL 10mEq/body×2	点滴	0.5 筒	↑	↑	↑		↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30 分/点滴
②シスプラチニン	10mg	生食 400mL	120 分/点滴
	25mg		
	50mg		
③ パロノセトロン	0.75mg	生食 100mL	30 分/点滴
③ アロカリス	235mg		
③ デキサート	3.3mg		
④ 硫酸マグネシウム		生食 500mL	60 分/点滴
④ KCL			
⑤ マンニットール	300mL		30 分/点滴
⑥ 生食	500mL		60 分/点滴
⑦ 生食	50mL		5 分/点滴



【備考】

⑥生食 (500) : メインルート 50mL/h (最後の生食 500mL 終了時に終了できるように適宜速度調整)

CCRT 中、CDDP 投与は計 6 回、ペムプロリズマブ投与は計 2 回を上限とする