

レジメン番号	0890	レジメン名	モスネツズマブ単剤 2 コース目
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ルンスミオ
がん腫	濾胞性リンパ腫	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21
ルンスミオ 60mg/body	点滴	60mg	↑	3 週間を 1 コース

(支持療法)				
デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑	3 週間を 1 コース

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	生食	250mL	生食 190mL	50mL/h
②	ルンスミオ	1mg 30mg		120 分/点滴
③	デキサート	3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴
④	生食	100mL		30 分/点滴
⑤	生食	50mL		5 分/点滴

投与間隔≫

(50mL/h) (15 分) (30 分) (120 分) (5 分)

投与順番≫

① → ③ → ④ → ② → ⑤ → 終了

【備考】

①生食 250mL（メインルート）上記はすべて側管から投与する。

・ 休薬後の再開方法については、適正使用ガイド参照

・ 前投薬として、アセトアミノフェン（500mg）1T/ポララミン（5mg）1T 内服（任意：主治医判断）

・ デキサート 3.3mg 6A は、デカドロロン 4mg 4T へ変更可能。