

レジメン番号	0891	レジメン名	モスネツズマブ単剤 3-17 コース目
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ルンスミオ、デキサート
がん腫	濾胞性リンパ腫	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
ルンスミオ 30mg/body	点滴	30mg	↑	3週間を1コース	↑

(支持療法)

デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑	3週間を1コース	↑
----------------------	----	--------	---	----------	---

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	生食	250mL		50mL/h
②	ルンスミオ	1mg	生食 70mL	120 分/点滴
		30mg		
③	デキサート	3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴
④	生食	100mL		30 分/点滴
⑤	生食	50mL		5 分/点滴

投与間隔》 (50mL/h) (15分) (30分) (120分) (5分)

投与順番》 ① → ③ → ④ → ② → ⑤ → 終了

【備考】

①生食 250mL (メインルート) 上記はすべて側管から投与する。

・休薬後の再開方法については、適正使用ガイド参照

・前投薬として、アセトアミノフェン (500mg) 1T/ポララミン (5mg) 1T 内服 (任意：主治医判断)

・サイトカイン放出症候群 (CRS) が無ければ、デキサートは中止可。

・デキサート 3.3mg 6A は、デカドロン 4mg 4T へ変更可能。