

レジメン番号	0892	レジメン名	テクリスタマブ単剤 1コース目
登録診療科	血液内科	使用薬剤	テクベイリ、デキサート
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	25 日

【投与量・投与スケジュール】

入院管理

薬品名 投与量	投与 方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day3 ( / )	Day5 ( / )	Day12 ( / )	Day19 ( / )	…Day25
テクベイリ 0.06mg/kg	皮下注射	mg	↓					
テクベイリ 0.3mg/kg	皮下注射	mg		↓				
テクベイリ 1.5mg/kg	皮下注射	mg			↓	↓	↓	
(支持療法)								
デキサート 16.5mg/body	点滴	16.5mg	↓	↓	↓	↓		

25 日間で 1 コース

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
① テクベイリ皮下注		30mg		皮下注射
		153mg		
② デキサート		3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴

投与間隔》 (15 分) (皮下注)

投与順番》 ② → ① → 終了

【備考】

- ・漸増期の投与後 48 時間は、必ず入院管理が必要。
- ・テクベイリ 0.3mg/kg 投与日は 3~5 日で投与可
- ・テクベイリ初回 1.5mg/kg 投与日は、0.3mg/kg 投与日+2~4 日で投与可
- ・2 回目以降の 1.5mg/kg 投与日は、テクベイリ初回 1.5mg/kg 投与日から 1 週間おきに投与可
- ・1 コース目の 0.06mg/kg, 0.3mg/kg, 初回 1.5mg/kg 投与時、前投薬として  
アセトアミノフェン (500) 2T、ポララミン (5) 1T を内服
- ・デキサートは、デカドロン 4mg/4 錠内服でも可
- ・休薬後の再開方法は適正使用ガイドに則る。
- ・前投薬は、day1, 3, 5 必須。Day12 以降は任意。